

برونکوسکوپی



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	برونکوسکوپی کد: الف . پ . ۱۲۰
تهیه کننده	سوپروایزر آموزش سلامت: سوسن قصرساز - رابط آموزش به بیمار: سیدمادح احمدی هوشبری
تایید کننده	کارگروه آموزش به بیمار
سال تهیه: ۱۴۰۳/۶	بازبینی: ۱۴۰۴/۶
منابع:	۱) بروئر و سودارث - پرستاری داخلی - جراحی ۲) https://dr-moosavi.iry
پزشک تایید کننده:	دکتر شاهرخ ابن رسولی - متخصص بیهوشی
ناظر کیفی:	دکتر خالد فتحی زاده - فوق تخصص ریه - ریس مرکز
آدرس	بلوار توحید - مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید مرکز جراحی قلب شهید رجایی تلفن: ۰۸۷۳۳۲۸۶۱۱۲ - واحد آموزش به بیمار و پیگیری

برونکوسکوپی چیست؟

یک روش کم تهاجمی جهت تشخیص بیماریهای ریه و مجاری هواست. پزشکان از برونکوسکوپ برای معاینه نای و ریه ها استفاده می کنند. آنها همچنین از این روش برای نمونه برداری از بافت (بیوسپی) هم استفاده می کنند. هدف از انجام برونکوسکوپی بر طرف کردن مشکلات مربوط به نای و ریه است.

مزایای انجام برونکوسکوپی

روش کم تهاجمی و سرپایی است. می تواند جایگزین جراحی باز باشد. نیاز به برش بافت های بدن وجود ندارد. آمادگی جهت انجام برونکوسکوپی بیمار به مدت ۶ ساعت NPO باشد. فرم رضایت جهت انجام برونکوسکوپی تکمیل شده باشد. وسایل اضافی بیمار (مانند دندان مصنوعی و ...) خارج گردد. بیمار لباس مناسب داشته باشد. آزمایشات بیمار کامل چک گردد. اختلال انعقادی چک شود. بیمار به مدت یک هفته وارفارین / ASA / هپارین / پلاویکس / ریوروساوان مصرف نکرده باشد. بیمار CT اسکن داشته باشد. اقدامات طی درمان:

به دلیل استفاده از لیروفائین بلع بیمار
تاچند ساعت دچار مشکل است که باید
به بیمار آموزش داده شود.

علائم هشدار دهنده: خونریزی -
عفونت - پرفوراسیون ریه - کلایپس
ریه ها - تنگی نفس - سرم - درد قفسه
سینه

-فرم رضایت نامه امضا شود.
-لیست داروهایی که بیمار به آن
حساسیت دارد، قید گردد.
این روش به مدت ۵۱ دقیقه طول می
کشد.

بیمار بر روی تخت به صورت
سوپاین(خوابیدن به پشت) بخوابد.
لیروکانین جهت بی حسی در انتهای
حلق و سورخهای بینی تزریق می
شود..

سوند اکسیژن بینی (نازال) بی بیمار
وصل شود

اقدامات پس از انجام برونکوسکوپی:
تا ۲ ساعت به بیمار هیچ گونه غذایی
داده نشود. پس از گذشت ۲ ساعت
مایعات و غذاهای ولرم داده شود.