

در صورت خونریزی از زیر دستبند پرستار خود را مطلع سازید. در صورت داشتن درد غیر قابل تحمل یا کبودی در دست در زمان بستری پرستار خود را مطلع فرمائید.

پرهیز از خم کردن یا حرکت شدید مچ دست تا ۴۸ ساعت پس از آنژیوگرافی  
 پرهیز از بلند کردن اجسام با وزن ۱۰ پوند (۴/۵ کیلوگرم تا ۴۸ ساعت پس از آنژیوگرافی تا ۲ روز بعد از آنژیوگرافی، از رانندگی خودداری کنید.  
 نیازی به پانسمان محل سوراخ شدن پوست پس از باز کردن مچ بند نمی باشد.  
 کنترل محل سوراخ شدن پوست از نظر کبودی خونریزی و سفت شدگی و در صورت بروز موارد ذکر شده پرستار و پزشک خود را مطلع نمائید.  
 در صورتیکه پس از ترخیص از محل سوراخ شدن پوست خونریزی اتفاق افتاده ضمن حفظ خونسرمدی بنشینید و با انگشت روی محل را به مدت ۱۰ دقیقه محکم فشار دهید. در صورت بروز مشکلات زیر پس از ترخیص به پزشک معالج با مرکز درمانی مراجعه نمائید .

هرگونه واکنش آلرژیک و حساسیتی کبودی، قرمزی و خونریزی در ناحیه زخم خروج ترشحات زرد رنگ از محل زخم کاهش حس و حرکت در دست هرگونه تغییر رنگ پوست در ناحیه مچ و کف دست را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

## مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال (مچ دست)



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان آموزش	مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی از طریق شریان رادیال (مچ دست)
تهیه کننده	سوپروایزر آموزش سلامت: سوسن قصرساز - رابط آموزش به بیمار: علویه مبارکی
تایید کننده	کارگروه آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۳/۶ بازبینی: ۱۴۰۴/۶
منابع:	۱) برونر و سودارت - پرستاری داخلی - جراحی <a href="https://clinic-aram.com/">https://clinic-aram.com/</a>
پزشک تایید کننده:	دکتر محمد خالده تقشبندی - متخصص قلب و عروق
ناظر کیفی:	- رئیس مرکز دکتر خالد فتحی زاده فوق تخصص ریه
آدرس	بلوار توحید - مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید مرکز جراحی قلب شهید بروجردی تلفن: ۰۸۷۳۳۲۸۶۱۱۲ - ۱۷ - واحد آموزش به بیمار و پیگیری