




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گردگان
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی توحید و جراحی قلب شهید رجایی
دقتربسود کینیت و اعتبار بخشی

کاتتر دائم یا پرمیکت



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	آموزش بیماران تحت کاتتر دائم یا پرمیکت کد: الف . پ . ۱۵
تهیه کننده	سوپروایزر آموزش سلامت: سوسن قصرساز - رابط آموزش به بیمار: سیدمادح احمدی هوشبری
تایید کننده	کارگروه آموزش به بیمار
سال تهیه:	۱۴۰۳/۶ بازبینی: ۱۴۰۴/۶
منابع:	(۱) برونر و سودارث - پرستاری داخلی - جراحی http://www.ir/۲
پزشک تایید کننده:	دکتر شاهرخ این رسولی متخصص بیهوشی فلوشیپ درد
ناظر کیفی:	دکتر خالد فتاحی زاده فوق ریه - رئیس مرکز
آدرس	بلوار توحید - مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحیدمركز جراحی قلب شهید رجایی بروجردی تلفن: ۰۸۷۳۳۲۸۱۱۱۲-۱۷- واحد آموزش به بیمار و پیگیری

پرمیکت یک لوله قابل انعطاف است که معمولاً داخل ورید در ناحیه گردن گذاشته می شود. بهترین زمان استفاده از پرمیکت ۶ ماه بوده که در صورت عدم بروز لخته و دیگر عوارض کاتتر گذاری تا یک سال قابل استفاده خواهند بود. این نوع دسترسی در بیمارانی که عروق مناسبی برای تعبیه فیستول وگرافت ندارند توصیه می شود.

موارد استفاده از پرمیکت

- ❖ جهت انجام دیالیز به عنوان کاتتر دائم
- ❖ گرفتن نمونه خون
- ❖ جهت تزریق دارو و مایعات به افراد بستری در معالجات طولانی
- ❖ جهت انجام شیمی درمانی
- ❖ جهت انجام تغذیه کامل وریدی
- ❖ نیاز به تعویض خون مانند مسمومیت الککل و مواد مخدر و ...

آمادگی ها

- چک کردن آزمایشات خونی از جمله فاکتورهای انعقادی
- بیمار فرم رضایت آگاهانه را تکمیل و امضا نماید

اقدامات طی درمان

- معمولاً تحت بیهوشی عمومی انجام می شود.
- این عمل به روش استریل انجام می شود.
- تخت گاید فلوروسکوپی یا سونوگرافی انجام می شود.
- بیمار حین عمل باید در حالت خوابیده به پشت بخوابد.
- در شروع عمل، یک دوز آنتی بیوتیک درون وریدی به شما تزریق می شود .
- مدت زمان انجام عمل کاتتر گذاری حدوداً ۴۵ دقیقه طول می کشد.

- پوست با مایع ضد عفونی کننده تمیز می شود و سپس ماده بی حسی موضعی تزریق می شود.

عوارض پرمیکت گذاری

- درد - آمبولی هوا - خونریزی - تجمع خون یا هوا در پرده جنب - اختلالات ریتم قلبی - احتمال پارگی شریان های اصلی و حتی آئورت - ایجاد لخته در محل ورود پرمیکت

مراقبت های بعد از پرمیکت گذاری

- پس از پرمیکت گذاری باید از فعالیت های شدید و شنا کردن پرهیز شود.
- پانسمان روی پرمیکت همیشه تمیز و خشک باشد.
- دوش گرفتن ساده به شرط خیس نشدن پرمیکت بلامانع است.
- سر لوله های پرمیکت هیچ وقت نباید در معرض هوا قرار گیرد. همیشه در پوش لوله ها باید بسته باشد.

- در زمان استفاده از پرمیکت در موقع دیالیز هم بیمار و هم پرستار باید بر روی دهان و بینی خود ماسک داشته باشند.

- از وارد کردن ضربه و کشش و خم کردن کاتتر خودداری کنید.

- به هیچ عنوان نباید از کاتتر جهت خون گیری یا وصل سرم استفاده شود.

- کلمپ های کاتتر به جز زمان دیالیز و آن هم توسط پرستار ، به هیچ وجه نباید باز و بسته شوند.

- قسمت خارجی کاتتر به هیچ وجه نباید در آب وان یا استخر غوطه ور بماند.

- در پوش ها و کلمپ های کاتتر شما وقتی برای دیالیز استفاده نمی شوند باید کاملا بسته نگه داشته شوند.

چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟

در صورت احساس درد ، تورم ، قرمزی، خونریزی، کبودی ، آسیب به عروق خونی و یا ترشح چرکی موضع و تب و لرز پزشک را مطلع نمایید.

مراقبت های پس از برداشتن پرمیکت

- پانسمان فشاری روی موضع را تا ۲۴ ساعت بعد داشته باشید.

- سپس موضع را با اب و صابون شسته پانسمان معمولی بذارید.

- اگر کاتتر پرمیکت در ناحیه گردن است بیشتر در پوریشن **نشسته** و اگر در ناحیه ران یا قرار گرفته بقیه روز در پوزیشن **خوابیده به پشت** قرار بگیرید.

- اگر خونریزی رخ داد موضع را با گاز استریل محکم فشار دهید . در صورتی که خونریزی شدید بود فوراً اورژانس را خبر کنید.